

## 効能・効果

体力に関わらず使用でき、のどが渇いて尿量がすくないもので、めまい、はきけ、嘔吐、腹痛、頭痛、むくみなどのいずれかを伴う次の諸症：水様性下痢、急性胃腸炎（しぶり腹のものには使用しないこと）、暑気あたり、頭痛、むくみ、二日酔

## 日本漢方生薬製剤協会による主な商品例

|                       |         |                |           |
|-----------------------|---------|----------------|-----------|
| ウチダの五苓散               | ウチダ和漢薬  | 五苓散料エキス散〔勝昌〕   | 東洋薬行      |
| [救心漢方]五苓散             | 救心製薬    | 五苓散料エキス錠〔大峰〕   | 大峰堂薬品工業   |
| クラシエ五苓散錠              | クラシエ薬品  | 五苓散料「タキザワ」     | タキザワ漢方廠   |
| 光風（エキス顆粒）             | 建林松鶴堂   | JPS五苓散料エキス錠N   | ジェーピーエス製薬 |
| ゴレーンS「コタロー」(五苓散料エキス錠) | 小太郎漢方製薬 | 錠剤 五苓散         | 一元製薬      |
| 五苓散エキス顆粒SA            | 湧永製薬    | スイギャクEP錠       | 劑盛堂薬品     |
| 五苓散料A                 | 大杉製薬    | ツムラ漢方五苓散料エキス顆粒 | ツムラ       |
| 五苓散料Aエキス細粒「分包」三和生薬    | 三和生薬    | トチモトの五苓湯       | 栃本天海堂     |
| 五苓散料エキス〔細粒〕16         | 松浦薬業    | 本草五苓散顆粒-R      | 本草製薬      |

## 使用上の注意

### してはいけないこと

次の人は服用しないこと  
生後3ヵ月未満の乳児。

### 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - 医師の治療を受けている人。
  - 妊婦または妊娠していると思われる人。
  - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症 状       |
|------|-----------|
| 皮 膚  | 発疹・発赤、かゆみ |

- 1ヵ月位（急性胃腸炎、二日酔に服用する場合には5～6回、水様性下痢、暑気あたりに服用する場合には5～6日間）服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## 処方構成生薬

沢瀉、猪苓、茯苓、蒼朮または白朮、桂皮

## 五苓散の体力分類に対する適応度（服用される方の普通の体力でお考えください）

| I 体力虚弱 | II やや虚弱 | III 体力中等度 | IV 比較的体力がある | V 体力充実 |
|--------|---------|-----------|-------------|--------|
| 1      | 1       | 2         | 1           | 1      |

2：最適、1：適応可能、0：原則としては適さない